Il catalogo delle piante da orto

www.fioridelledolomiti.it

Chi siamo

FioridelleDolomiti è un'azienda di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, specializzata nella produzione e vendita di piante d'appartamento e da giardino. Grazie all'esperienza maturata i diversi anni di attività, Fiori delle Dolomiti si presenta oggi come leader sul mercato e importante punto di riferimento in tutto il territorio limitrofo. Le piante sono coltivate con impianti innovativi nel rispetto dell'ambiente: disponiamo di un vasto assortimento con piante forti, sane e con una bellezza di colori inconfondibili.

Grazie ad uno staff di professionisti seguiamo il cliente passo dopo passo fornendogli consigli preziosi sulle specie più adatte alle sue esigenze e sulle cure per piantare, trapiantare e potare fiori e piante, al fine di realizzare un giardino perfetto in poco tempo e con il minimo sforzo. Disponiamo di piante e fiori delle migliori marche del settore, dalle piante da giardino ai fiori per l'esterno fino alle piante da appartamento, per la maggior parte di origine esotica.

Ci occupiamo sia della coltivazione che della vendita all'ingrosso di piante per interni ed esterni: effettuiamo inoltre la vendita al dettaglio di fiori e piante nei nostri negozi a marchio 'Trentino Plant' siti a Pergine Valsugana, Trento e Rovereto.

Contattaci e ti seguiremo nella realizzazione del tuo giardino da sogno e dei i tuoi addobbi per ogni occasione!

Aglio Bianco

Varietà a bulbo bianco come i suoi spicchi, con maturazione medio-precoce. È ideale per il fresco consumo, dal sapore e dall'aroma piccante, ha un' ottima conservabilità. La pianta non ama il freddo autunno-invernale. È a questo punto che il tubero sotterraneo andrebbe raccolto. I bulbi che invece si lasciano in loco, rivegeteranno l'anno seguente, coi primi caldi. Formeranno anche bulbilli (piccoli bulbi cresciuti lateralmente al bulbo-madre).

Anguria Mini Rossa

Frutto piccolo del peso di 1,5-2 kg. L'interno, rosso vivo, è molto dolce e saporito. TRAPIANTO: a marzo in serra e da aprile a maggio in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 1 metro tra le piante sulla fila e 2 m tra le file. POSIZIONE: predilige il clima temperato caldo con sole pieno e acqua in abbondanza. Il terreno deve esssere di medio impasto, sciolto, ricco di sostanza organica. RACCOLTA: da Luglio a Settembre. Matura a 70 giorni dal trapianto.

Anguria Moretta

TRAPIANTO: a marzo in serra e da aprile a maggio in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 1 metro tra le piante sulla fila e 2 m tra le file. POSIZIONE: predilige il clima temperato caldo con sole pieno e acqua in abbondanza. Il terreno deve esssere di medio impasto, sciolto, ricco di sostanza organica. RACCOLTA: da Luglio a Settembre.
Matura a 70 giorni dal trapianto.

Anguria Rigata

Produce frutti di dimensioni notevoli particolarmente zuccherini, si consiglia di irrigare molto soprattutto durante l'accrescimento dei frutti. TRAPIANTO: a marzo in serra e da aprile a maggio in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 1 metro tra le piante sulla fila e 2 m tra le file. POSIZIONE: predilige il clima temperato caldo con sole pieno e acqua in abbondanza. Il terreno deve esssere di medio impasto, sciolto, ricco di sostanza organica RACCOLTA: da luglio a settembre. Matura a 70 giorni dal trapianto.

Asparago Verde Grande F1

Ibrido Californiano di cloni molto precoce di origine californiana, regolare e di eccellente presentazione. I turioni, di ottima qualità, sono di calibro 16/18 mm con brattee verde intenso, ben aderenti alla punta del turione. Varietà indicata per colture forzate sotto tunnel o serre, per la produzione di asparago verde nelle zone mediterranee a clima caldo-secco, per il mercato fresco e per l'industria. TRAPIANTO: da Novembre ad Aprile SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila, 100-120 cm tra le file.

Basilico Genovese

La pianta è eretta con foglie verdi e brillanti, di forma ovale, molto aromatico. Coltivabile in serra o campo aperto da aprile in poi. TRAPIANTO: da marzo a giugno. SESTI D'IMPIANTO: 70 tra fila e fila 40 tra le file. POSIZIONE: cresce molto bene in pieno sole ma produce anche in luoghi ombreggiati. RACCOLTA: le foglie si iniziano a raccogliere dopo un mese dal trapianto da maggio ad ottobre.

Basilico Greco

Il basilico coltivato in ambienti ombreggiati produce in misura inferiore ma ne viene esaltato il profumo delle foglie.Nel periodo che precede la fioritura, asportare i germogli apicali, permetterà alla pianta di crescere maggiormente. TRAPIANTO: da marzo in serra, da aprile ad agosto all'aperto. SESTI D'IMPIANTO: 20 cm tra una pianta e l'altra. POSIZIONE: cresce molto bene in pieno sole, ma anche in luoghi ombreggiati.RACCOLTA: le foglie si raccolgono dopo 1 mese dal trapianto da maggio ad ottobre.

Basilico Rosso

La pianta presenta foglie grandi, dentate, di color porpora/violaceo tanto che è nota anche come Basilico viola. I fiori sono rosa. Si tratta di una pianta che cresce molto rapidamente raggiungendo un'altezza media compresa tra i 30 e i 50 cm. È una pianta che può essere coltivata sia in vaso che in piena terra. Cresce in pieno sole e mezz'ombra. Non sono tollerate temperature al di sotto dei 10° C. Gradisce annaffiature frequenti, ma con un suolo ben drenato.

Bieta Coste

Pianta dalle coste bianche e larghe, foglie di colore verde brillante. Defogliata ricaccia velocemente. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra; da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 20 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma permette buone produzioni anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a novembre. La raccolta delle foglie si effettua a scalare, recidendo con un coltello le foglie esterne della pianta.

Carciofo Viola Di Romagna

Varietà dal colore viola, molto saporita. La pianta è robusta e molto produttiva. Tolto il frutto principale la pianta ricaccia abbondantemente TRAPIANTO: da marzo a giugno. SESTI D'IMPIANTO: 80 cm sulla fila e 90 cm tra una fila e l'altra. POSIZIONE: in pieno sole e in luoghi riparati dai rigori invernali e dal vento. RACCOLTA: da aprile a maggio dell'anno successivo all'impianto ma qualche capolino può essere raccolto dopo qualche mese dal trapianto.

Cardo

Pianta dalle coste bianche e larghe, foglie di colore verde brillante. Defogliata ricaccia velocemente. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra; da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 20 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma permette buone produzioni anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a novembre. La raccolta delle foglie si effettua a scalare, recidendo con un coltello le foglie esterne della pianta.

Cavolfiore Bianco Precoce

Varietà ibride di eccellente qualità, sono caratterizzati da ampia adattabilità ai vari climi e ambienti. Producono corimbi del peso di circa 1 kg. Si consiglia di irrigare e concimare con regolarità. TRAPIANTO: febbraio ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 50 tra fila e fila 70 tra le file. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da maggio a novembre, e generalmente dopo 70 – 80 giorni dal trapianto.

Cavolfiore Bianco Tardivo

Pianta vigorosa dalla maturazione tardiva. Il corimbo di colore bianco raggiunge i 1200 grammi di peso. È un ibrido particolarmente resistente alle basse temperature e indicato nelle zone con problemi di elevata umidità. TRAPIANTO: da luglio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: dai 50 ai 60 cm tra una pianta e l'altra. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: a marzo e generalmente 150 giorni dopo il trapianto.

Cavolo Broccolo Pugliese

La pianta, molto rustica, resiste bene in campo alle diverse avversità climatiche. La testa, a forma di cupola a grana fine di colore verde scuro. Ottima emissione di ricacci laterali. TRAPIANTO: marzo - novembre. SESTI D'IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 50 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: 80-90 giorni.

Cavolo Cappuccio Appuntito

Varietà precoce, di qualità eccellente e con sapore particolarmente dolce. Le teste sono compatte, di struttura solida e con midollo corto. Notevole è la rusticità e la tolleranza alla sovra maturazione. TRAPIANTO: marzo - ottobre. SESTI D'IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 50 sulla fila POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: 50-60 giorni.

Cavolo Cappuccio Piatto

Produce teste di grandi dimensioni leggermente piatte. TRAPIANTO: marzo - luglio. SESTI D'IMPIANTO: 60 tra fila e fila POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: 80 - 100 giorni.

Cavolo Cappuccio Tondo

Pianta di taglia media a testa rotonda di colore verde, dal peso medio di 1-1,2 Kg. Ideale nella dieta dei diabetici. TRAPIANTO: marzo - ottobre. SESTI D'IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 40 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: 65 giorni.

Cavolo Cappuccio Tondo Crauti

Cappuccio tondo, del peso di 2 kg circa, molto resistente alle spaccature e buona conservabilità. Adatto sia al consumo fresco che alla trasformazione. TRAPIANTO: aprile - ottobre. SESTI D'IMPIANTO: 50 tra fila e fila, 60 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da aprile a ottobre.

Cavolo Cinese

Ricco di vitamina C e A, sali minerali, acido folico e potassio mentre, essendo ricco d'acqua, ha un contenuto calorico molto basso. Molto tenero ideale per condire crudo. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm tra fila e fila 40 tra le file. RACCOLTA: da ottobre.

Cavolo Bruxelles

Per avere maggiori produzioni si consiglia di piantare le giovani piante già giugno o luglio, questo consente di ottenere una pianta con fusto più alto e quindi di ottenere un maggior numero di frutti. TRAPIANTO: da giugno ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: dai 50 ai 60 cm tra una pianta e l'altra. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da ottobre.

Cavolo Rapa

Ibrido particolarmente indicato per le colture invernali, si coltiva con estrema facilità anche in climi e ambienti non ottimali. Si consuma crudo condito con olio, pepe e sale. TRAPIANTO: da maggio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila, 40 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: la raccolta si inizia quando la rapa ha le dimensioni di una mela (circa dopo un mese), tuttavia se lasciato in campo, il cavolo rapa aumenta le dimensioni mantenendo inalterate le qualità organolettiche.

Cavolo Verza

Varietà ibride di eccellente qualità, sono caratterizzati da ampia adattabilità ai vari climi e ambienti. Producono corimbi del peso di circa 1 kg. Si consiglia di irrigare e concimare con regolarità. TRAPIANTO: febbraio ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 50 tra fila e fila 70 tra le file POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a novembre, e generalmente dopo 70 – 80 giorni dal trapianto.

Cavolo Verza Rossa

Questo ibrido trapiantato verso luglio permette di ottenere verze di dimensioni notevoli che si consumano soprattutto nelle prima parte dell'inverno; i trapianti effettuati più tardi garantiscono raccolti fino ad aprile. È un ibrido con ottima tenuta al gelo. TRAPIANTO: da luglio ad agosto SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 50 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da ottobre fino ad aprile.

Cetriolino Sottaceti

Varietà ibride di eccellente qualità, sono caratterizzati da ampia adattabilità ai vari climi e ambienti. Producono corimbi del peso di circa 1 kg. Si consiglia di irrigare e concimare con regolarità. TRAPIANTO: febbraio ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 50 tra fila e fila 70 tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a novembre, e generalmente dopo 70 – 80 giorni dal trapianto.

Cetriolo Olandese Lungo ad alta digeribilità

Particolarmente apprezzato per la facile digeribilità dei suoi frutti che raggiungono i 25 cm di lunghezza. Pianta forte estremamente produttiva. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a luglio all'aperto. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sia tra una pianta e l'altra che tra file. POSIZIONE: in pieno sole e su terreni dotati di buona fertilità. RACCOLTA: da maggio ad ottobre, generalmente i primi frutti si raccolgono 60 giorni dopo il trapianto.

Cetriolo Verde

Il cetriolo irrigato con regolarità produce frutti più serbevoli. La mancanza di acqua e periodo siccitosi facilita infatti la produzione di frutti amari. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a luglio all'aperto. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sia tra una pianta e l'altra che tra file. POSIZIONE: in pieno sole e su terreni dotati di buona fertilità. RACCOLTA: da maggio ad ottobre. Generalmente i primi frutti si raccolgono 30 giorni dopo il trapianto.

Cicoria Castelfranco Precoce

Cespo voluminoso, rotondo, compatto, fogliame interno sottile con nervatura poco pronunciata, con lievi variegature rosse. Priva di gusto amaro. Buona resistenza alla prefioritura, teme però le basse temperature. TRAPIANTO: da fine luglio e per tutto agosto. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: matura in 90 giorni dal trapianto (la raccolta si effettua nel tardo autunno).

Cicoria Castelfranco Tardiva

Cespo a rosetta con foglie bianco-verdi, screziate rosso e leggermente frastagliate ai margini. Ha funzioni depurative. TRAPIANTO: da fine Luglio e per tutto. Agosto. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: matura in 90 giorni dal trapianto (la raccolta si effettua nel tardo autunno).

Cicoria Catalogna

Varietà particolarmente resistente alla salita a seme che si adatta ad essere coltivata durante tutto l'anno mantenendo costanti le sue caratteristiche di produttività e uniformità. TRAPIANTO: da febbraio ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 30-35 cm sulla fila, 40-50 cm tra le fila. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a novembre e generalmente dopo 60-65 giorni dal trapianto.

Cicoria Chioggia Precoce

Pianta vigorosa e rustica, produce grumoli del peso di 300-400 grammi con ottima resistenza alla salita a seme. TRAPIANTO: da marzo a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: matura dopo circa 45 giorni dal trapianto.

Cicoria Chioggia Tardiva

Pianta molto vigorosa di grande resa produttiva e di elevata resistenza alle gelate, mantiene molto a lungo le sue ottime qualità organolettiche. TRAPIANTO: da fine luglio e fino a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: dopo 130 giorni dal trapianto e generalmente in inverno.

Cicoria di Verona Precoce

Varietà particolarmente apprezzata per la produzione di cespo dalle caratteristiche organolettiche eccellenti e dal peso medio di 200-250 grammi. Pianta particolarmente rustica. TRAPIANTO: da fine luglio e per tutto agosto. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: si raccoglie nel tardo autunno e generalmente 90 giorni dopo il trapianto.

Cicoria Lusia Precoce

Produce un cespo voluminoso molto croccante e di ottimo gusto del peso di circa 400 grammi. Per ottenere foglie più croccanti e cespi più voluminosi si consiglia di effettuare abbondanti irrigazioni. TRAPIANTO: da Maggio a Settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a novembre.

Cicoria Luisa Tardiva

Produce un cespo voluminoso molto croccante e di ottimo gusto del peso di circa 400 grammi. Per ottenere foglie più croccanti e cespi più voluminosi si consiglia di effettuare abbondanti irrigazioni. TRAPIANTO: da maggio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: a 120 giorni.

Cicoria Pan di Zucchero

Produce cespi di ottime dimensioni e di buon gusto. È consigliabile effettuare frequenti irrigazioni per ottenere cespi più croccanti. TRAPIANTO: da maggio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 40 cm tra le file POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre; dopo circa 70 giorni dal trapianto.

Cicoria Treviso Precoce

Produce cespi di ottime dimensioni e di buon gusto. È consigliabile effettuare frequenti irrigazioni per ottenere cespi più croccanti. TRAPIANTO: da maggio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 40 cm tra le file POSIZIsNE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre; dopo circa 70 giorni dal trapianto.

Cicoria Treviso Tardivo

Pianta rustica e vigorosa che produce cespi del peso di 300- 350 grammi. Dieci giorni prima della raccolta se ne consiglia la legatura per favorire una migliore maturazione. TRAPIANTO: da fine Luglio e per tutto Agosto SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: In inverno e generalmente 110-120 giorni dal trapianto.

Cicoria Treviso Tardivo d'acqua

Pianta rustica e vigorosa che produce cespi del peso di 300- 350 grammi. Dieci giorni prima della raccolta se ne consiglia la legatura per favorire una migliore maturazione. TRAPIANTO: da fine luglio e per tutto agosto. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: In inverno e generalmente 110-120 giorni dal trapianto.

Cicoria Verona Tardiva

Selezione particolarmente resistente al gelo invernale, produce teste del peso di 400-500 grammi. Il sapore a maturazione è molto dolce. TRAPIANTO: da fine luglio e per tutto agosto. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila e 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: In inverno (la raccolta si protrae fino a tutto febbraio) e generalmente 130-160 giorni dal trapianto.

Cipolla Bianca Tonda Musona

La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A, indispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle estive vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Cipolla Gialla Tonda Dorata

La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A, indispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle estive vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Cipolla Piatta di Maggio

È una cipolla nata per il consumo fresco, quindi di limitata conservabilità. TRAPIANTO: da ottobre a febbraio. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle estive vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Cipolla Rocca Bruna sel. Montoro

La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A, indispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle estive vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Le varietà invernali possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Cipolla Rossa Lunga di Tropea

La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A, indispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: avviene quando le foglie ingialliscono.

Cipolla Rossa Tonda di Tropea

La cipolla contiene molti sali e vitamine in particolare la vitamina A, indispensabile nel nostro organismo perché interviene nella formazione di pigmenti visivi e nel mantenimento della normale struttura della pelle. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 25 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: avviene quando le foglie ingialliscono.

Cipollotto bianco di Lisbona

Varietà dal bulbo tunicato di forma cilindrica, schiacciata ai poli, con leggero ingrossamento alla base delle foglie, colore delle tuniche interne ed esterne interamente bianco, polpa succulenta e di sapore dolce. E' utilizzata soprattutto per il consumo fresco. TRAPIANTO: aprile - ottobre. SESTI D'IMPIANTO: 20 tra fila e fila, 20 sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da marzo a giugno.

Erbette da taglio

La costa da taglio trae molto beneficio da concimazioni ricche di azoto e da abbondanti irrigazioni. Ciò consente di ottenere piante più produttive. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra; da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 10 cm sulla fila, 20 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma permette buone produzioni anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a novembre, dopo 30-40 giorni dal trapianto recidendo le foglie a livello del colletto con un coltello.

Fagiolino Nano

Pianta dalla straordinaria resa produttiva, produce anche nei periodi difficili caratterizzati da caldo estivo. Ottima resistenza anche alle malattie. TRAPIANTO: da aprile ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm tra le fila e 10 cm sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da maggio a ottobre.

Fagiolo Borlotto Nano

Pianta molto produttiva che esprime la sua potenzialità in terreni ricchi di sostanza organica ben drenati e con ripetute sarchiature. Il fagiolo è una piante appartenente alla famiglia delle leguminose detta MIGLIORATRICE in quanto lascia un terreno migliore rispetto a come l'aveva trovato. TRAPIANTO: da aprile ad luglio. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm tra le fila e 10 cm sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a ottobre.

Finocchio

Per ottenere grumi più bianchi e quindi croccanti è consigliabile effettuare più rincalzature. Il finocchio può essere coltivato anche in zone leggermente ombreggiate, TRAPIANTO: da aprile ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 20 cm tra una pianta e l'altra; tra le file 50 cm al fine di consentire le rincalzature in un secondo momento. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: matura tra i 60 giorni (nelle varietàa maturazione estiva) e i 80 giorni (nelle varietà a maturazione autunnale).

Fragola Rifiorente

Varietà molto rustica e produttiva. La raccolta si mantiene fino ad ottobre. Produce frutti di buone dimensioni molto profumati e particolarmente zuccherini. TRAPIANTO: da marzo a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 20 cm sulla fila, 30 cm tra una fila e l'altra. POSIZIONE: in luoghi soleggiati ma produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a settembre.

Fragola Uniphera

Pianta di buona vigoria,con portamento intermedio,di buona produttivita' e tollerante alle piu' comuni malattie. Frutto grosso ed uniforme,di forma conica,consistente,di colore rosso brillante e di buon sapore. Nessuna rifiorenza. TRAPIANTO: da marzo a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 20 cm sulla fila, 30 cm tra una fila e l'altra. POSIZIONE: in luoghi soleggiati ma produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da maggio a settembre.

Indivia Riccia

Ottime caratteristiche produttive e resistenza al freddo. Pianta di notevoli dimensioni con foglie abbondanti e chiuse che permettono un perfetto imbianchimento naturale. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in luoghi soleggiati ma produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Indivia Scarola

Varietà dal cespo compatto e omogeneo è autoimbiancante. Molto resistente alla salita a seme. TRAPIANTO: da marzo ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in luoghi soleggiati ma produce anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Barba dei Frati

Produce cespi abbondanti che possono essere consumatisia cotti che crudi. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile a novembre.

Lattuga Brasiliana

Produce teste molto compatte (simile al cappuccio) le cui dimensioni possono raggiungere i 500 gr. Pianta molto rustica e versatile, ha un'ottima resistenza alla salita a seme. TRAPIANTO: da febbraio a settembre SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile a novembre.

Lattuga Canasta

Cespo voluminoso e pesante che raggiunge anche gli 800 gr. Foglie di colore rosso vinoso che si attenua nei periodi più caldi dell'anno. Adatta per essere coltivata per tutto l'anno. TRAPIANTO: da febbraio a settembre SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga canasta Rossa

Lattuga di grandi dimensioni, di colore verde con sfumature rosse brillanti ai bordi delle foglie. Lentissima a montare. TRAPIANTO: da febbraio a settembre SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Cappuccina

Pianta rustica che ben si adatta a condizioni climatiche sfavorevoli; resistente alla salita a seme, produce teste voluminose e pesanti. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga foglia Quercia Rossa

Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande compattezza dalla foglia lobata, molto gustosa, di colore rosso brillante. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga foglia Quercia Verde

Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande compattezza dalla foglia lobata, molto gustosa, di colore verde brillante. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Gentilina

Cespo attraente di grandi dimensioni, dal sapore delicato. È una varietà molto facile da coltivare che cresce bene in qualsiasi condizione pedo climatica. Adatta per essere coltivata tutto l'anno. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Gentilina Rossa

Forma un cespo di buone dimensioni con foglia frastagliata, ottima la qualità gustativa. È una varietà molto rustica che produce bene anche in condizioni non ottimali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Lattuga Misticanza

Miscuglio costituito da diverse varietà di lattughe particolarmente adatte per essere coltivate da taglio. Trapianto durante tutto l'anno. TRAPIANTO: da febbraio a ottobre. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila, 40 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Lattuga Multifoglia Rossa

Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande compattezza dalle foglie numerose, molto gustosa, di colore rosso brillante. Adatta a colture invernali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile a novembre.

Lattuga Multifoglia Verde

Varietà da taglio e da cespo. La pianta è voluminosa, dotata di grande compattezza dalle foglie numerose, molto gustosa, di colore verde biondo brillante. Adatta a colture invernali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile a novembre.

Lattuga Regina dei Ghiacci

Pianta molto rustica che ben resiste al freddo e ai climi difficili, produce un cespo croccante e carnoso, particolarmente indicata per i trapianti tardo invernali e primaverili. TRAPIANTO: da febbraio a marzo. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Lattuga Romana

Forma un cespo ben CHIUSO e compatto le cui dimensioni possono raggiungere i 600-700 gr. Ha un'ottima tolleranza alla salita seme.TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Trentina

Forma un cespo di buone dimensioni con foglia frastagliata,ottima la qualità gustativa. È una varietà molto rustica che produce bene anche in condizioni non ottimali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lattuga Unicum

Pianta rustica e molto versatile produce cespi molto delicati e di ottimo gusto. Particolarmente indicata per terreni di montagna. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno a novembre.

Lollo Rossa

Varietà dal cespo voluminoso e con foglie arricciate dal colore rosso vinoso. Ideale sia per raccolte primaverili che estive ed autunnali. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Lollo Verde

Cespo voluminoso con fogliame riccio ideale sia per raccolte primaverili che estive e autunnali. Varietà di ottima rusticità e adattabilità ai diversi climi. TRAPIANTO: da febbraio a settembre. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Melanzana Bianca

Pianta di taglia media, adatta per colture di serra e pieno campo. Il frutto è di colore bianco con una polpa di consistenza carnosa. TRAPIANTO: marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sulla fila, 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Cinese Lunga Viola

Ottima selezione con frutto lungo, sottile ed allungato. Colore viola scuro. pianta robusta e resistente, molto produttiva. TRAPIANTO: marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sulla fila, 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Lunga Nera

Ibrido adatto sia per la coltivazione in pieno campo che in serra, molto rustica e produttiva. La melanzana è una coltura che predilige temperature mediamente elevate. Una corretta disponibilità idrica permette di ottenere frutti più dolci. La melanzana è particolarmente indicata nelle diete essendo molto povera di calorie. TRAPIANTO: marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Striata Viola

Pianta ricca di vitamina A e C. Il frutto è rotondo, con la buccia liscia e di colore viola striato di bianco alla base. La polpa è consistente e contiene pochi semi. TRAPIANTO: marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Tonda Nera

Ibrido indicato sia per la coltivazione in serra che in pieno campo. Polpa povera di semi e con ottime caratteristiche organolettiche. Predilige temperature mediamente elevate. Una corretta disponibilità idrica permette di ottenere frutti più dolci. La melanzana è particolarmente indicata nelle diete essendo molto povera di calorie. TRAPIANTO: marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40cm sulla fila, 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melanzana Tonda Viola

Pianta robusta con buona vigoria e produzione elevata ed uniforme. Frutti dalle dimensioni di circa 12x15 cm di colore violetto e di buona consistenza con pochi semi. TRAPIANTO: marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Melone Liscio Jolly

Pianta rustica e vigorosa che garantisce abbondanti produzioni di frutti molto dolci. Il melone è una pianta che predilige terreni fertili, assolati e con un'elevata disponibilità idrica. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 80 cm sulla fila, 150 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da marzo a giugno.

Melone Retato

Pianta rustica e vigorosa che garantisce abbondanti produzioni di frutti molto dolci. Il melone è una pianta che predilige terreni fertili, assolati e con un'elevata disponibilità idrica. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 80 cm sulla fila, 150 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da aprile o dopo 30 giorni dal trapianto.

Peperone 3/4 Giallo

Ibrido dalla produzione abbondante e continua, fornisce frutti di ottime dimensioni e con polpa spessa per tutto il periodo produttivo. La raccolta dei frutti effettuata prima del viraggio al giallo consente di ottenere produzioni più abbondanti. Per avere risultati ottimali si consiglia di irrigare e concimare regolarmente. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sulla fila, 70 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone 3/4 Rosso

Pianta vigorosa e di elevata produttività, produce frutti con polpa spessa e dolce. Può essere consumato anche da verde. La raccolta dei frutti effettuata prima del viraggio al rosso consente di ottenere produzioni più abbondanti. Per avere risultati ottimali si consiglia di irrigare e concimare regolarmente. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sulla fila, 70 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Corno Giallo

Pianta precoce vigorosa con frutti a forma conica allungata di un bel colore giallo intenso, la polpa è di sapore dolce e molto aromatica. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sulla fila, 70 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole .RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Corno Rosso

Pianta a portamento eretto con internodi corti. Resistente alle più comuni malattie, frutti lunghi 15cm. Con polpa liscia e spessa di colore rosso intenso. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm sulla fila, 70 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Friggitello

Varietà simile al peperone aceto (sigaretta) differenzia per produrre peperoni più tozzi particolarmente adatti per essere fritti. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Lombardo Dolce

Il peperone aceto, detto anche "sigaretta",è una pianta molto rustica e produttiva che da ottimi risultati anche in condizioni non ideali. È consigliato tuttavia effettuare irrigazioni abbondanti perché in caso di stress idrici e in concomitanza di caldi intensi i frutti possono diventare piccanti. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. e su terreni dotati di buona fertilità. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Moncheto

Varietà simile al peperone aceto (sigaretta) differenzia per produrre peperoni più tozzi particolarmente adatti per essere fritti. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Piccante Lungo

Produce frutti lunghi 14-16 cm molto piccanti. Mantiene un'elevata piccantezza anche durante l'inverno. I frutti più piccanti si ottengono da piante coltivate in ambienti caldi e leggermente siccitosi. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Piccante Tondo

Pianta molto produttiva sulla quale è distribuita una grande produzione di frutti mediamente piccanti. Molto indicati per la conservazione in vasetti sott'olio. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Peperone Trottola

Peperoncino dal colore intenso ideale per conserve e sottaceti. Per la sua curiosa forma in talune zone è conosciuto con il nome di CAPPELLO DEL VESCOVO. E' una pianta molto rustica facile da coltivare e con abbondante produzione. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila, 60 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Pisello Nano

Varietà precoce molto rustica e facile da coltivare, produce abbondanti baccelli con piselli dal gusto delicato e molto dolci. TRAPIANTO: da febbraio a maggio. SESTI D'IMPIANTO: 10 cm sulla fila e 40 cm tra una fila e l'altra. POSIZIONE: in pieno sole ma produce bene in zone parzialmente ombreggiate o in luoghi in cui le piante vicine germogliano tardi e permettono così al pisello di completare il suo ciclo colturale prima che vi sia l'ombra della vegetazione.RACCOLTA: da luglio a settembre.

Pomodoro Blank Krim/Camone

Il Camone è il nome che identifica un pomodoro con una personalità unica e spiccata, italiano al 100%. Dal gusto davvero unico che deriva dalla perfetta armonia tra acidità e grado zuccherino, presenta una particolare colorazione rosso-arancio con la parte superiore (la spalla) di colore verde intenso. TRAPIANTO: in serra da marzo ad aprile. All'aperto da aprile a giugno. SESTI D'IMPIANTO: 50 cm tra le file 40 cm sulla fila POSIZIONE: in pieno sole o parzialmente soleggiato. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Cencara

Una coltura trapiantata ha un ciclo di 100-120 giorni. Il pomodoro non ama gli ambienti umidi che favoriscono le malattie e i marciumi: predilige i climi piuttosto asciutti, in terreni con buona capacità di ritenzione idrica o con possibilità di irrigazione. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre. I frutti maturano dopo circa 50 giorni dal trapianto.

Pomodoro Ciliegino

Pianta alta. Frutti piccoli disposti in grappoli di colore rosso vivo. Ideale per decorazioni. Pianta di altissima produzione. Sapore dolce. Ciclo medio precoce. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 70 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre. I frutti maturano dopo circa 50 giorni dal trapianto.

Pomodoro Costoluto

Ibrido rustico e resistente. L'ottima consistenza e il saporedolce rendono questo pomodoro particolarmente indicato per la cottura alla griglia. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Cuor di Bue

Varietà particolarmente apprezzata per la produzionedi eccellenti frutti con pochi semi e polpa abbondante.Ottimo come pomodoro da insalata. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro da Mensa Giallo

Pomodoro tondo da insalata di grossa pezzatura dal colore giallo e di ottimo gusto. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Datterino

Pianta vigorosa e molto rustica. Produce moltissimi frutti dall'aroma, sapore e grado zuccherino inconfondibile e decisamente superiore a qualsiasi ciliegino. Data la grande vigoria di questa ibrido possono essere coltivati 2 rami per pianta, ciò consente di ottenere produzioni più abbondanti. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Fragolino Berry

Pianta indeterminata, vigorosa, ben aerata con internodi corti di buon vigore. Il grappolo porta moltissimi frutti di piccole dimensioni. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Peretto Palo S. Marzano

Varietà vigorosa a portamento indeterminato. Frutti pieni e pesanti, dal colore rosso brillante. L'uso principale è il mercato fresco, ma è indicato anche per conserve. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Strisciante Lungo

Pianta determinata, vigorosa e coprente. Resiste molto bene alle scottature. Ottimo per l'essicazione, fornisce rese elevate. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Strisciante Tondo

Pomodoro molto produttivo adatto sia per la coltivazione in serra che in pieno campo. Produce frutti di medie dimensioni molto uniformi. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Tondo

Ibrido rustico e resistente adatto sia per la coltivazione in serra e in pieno campo. Ottimo come pomodoro da insalata. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Pomodoro Tondo Grappoli

Pomodoro molto produttivo adatto sia per la coltivazione in serra che in pieno campo. Produce frutti di medie dimensioni molto uniformi. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile a giugno in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 40 cm sulla fila e 80 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre.

Porro

Per ottenere buoni risultati è consigliabile non coltivare il porro nuovamente sullo stesso luogo prima che siano trascorsi almeno quattro anni dalla coltura precedente. TRAPIANTO: da aprile a settembre. SESTI D'IMPIANTO: fra le piante 15 cm sulla fila, e 25 cm fra le file. POSIZIONE: cresce bene in terreni leggeri e fertili con buona esposizione al sole, resiste ai rigori invernali. RACCOLTA: da giugno a gennaio.

Prezzemolo Liscio

Varietà molto profumata con ottima resistenza al freddo. Per foglie più abbondanti si consiglia di concimare ed irrigare regolarmente. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra, da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 5 cm sulla fila, 15 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma da buoni risultati anche in ambienti parzialmente ombreggiati. RACCOLTA: da aprile a novembre e generalmente dopo 20 giorni dal trapianto.

Prezzemolo Riccio

Pianta aromatica, rustica, molto produttiva dal ciclo medio-precoce. Gli steli eretti e robusti portano foglie molto ricce dal colore verde scuro e dall'intenso profumo. TRAPIANTO: marzo - settembre. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila e 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio ad ottobre. I frutti maturano dopo circa 30 giorni dal trapianto.

Rape Rosse

Varietà molto rustica che garantisce ottime produzioni anche in condizioni climatiche non ottimali produce voluminosi radici dalle caratteristiche organolettiche eccezionali. TRAPIANTO: febbraio - agosto. SESTI D'IMPIANTO: 10 cm sulla fila e 30 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: la raccolta si inizia quando la rapa ha le dimensioni di una mela (circa dopo un mese dal trapianto),se lasciato in campo, aumenta di dimensioni mantenendo inalterate le qualità organolettiche.

Rucola Selvatica

La rucola si coltiva molto facilmente nell'orto essendo molto adattabile alle diverse condizioni pedo climatiche. La raccolta è prolungata nel tempo ed abbondante perché dopo il primo taglio rivegeta molto rapidamente. TRAPIANTO: da febbraio ad agosto. SESTI D'IMPIANTO: 10 cm sulla fila, 15 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole o leggermente ombreggiata. RACCOLTA: da aprile a novembre e generalmente 20 giorni dopo il trapianto

Scalogno Dorato

Varietà eccellente dalla forma allungata e dal colore giallo dorato, buona conservabilità. Svolge funzioni di antiossidante, digestive e diuretiche, rinforza unghie capelli. TRAPIANTO: da ottobre ad aprile. SESTI D'IMPIANTO: 15 cm sulla fila, 20 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: le cipolle estive vengono raccolte quando le foglie si ingialliscono. Levarietà invernali possono essere lasciate nel terreno per un periodo più lungo.

Sedano Bianco

Varietà molto produttiva e autoimbiancante, il sedano dorato produce gambi molto croccanti ottimi per essere consumati crudi (pinzimonio) ma anche negli altri usi richiesti in cucina. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma produce bene anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da giugno ad ottobre. Le foglie possono essere raccolte già un mese dopo il trapianto.

Sedano Rapa

Pianta molto produttiva e uniforme. Produce teste dalle ottime caratteristiche organolettiche. Si consiglia di coltivare il sedano rapa in terreni molto fertili e con buona disponibilità idrica. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 30 cm sulla fila, 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da giugno ad ottobre.

Sedano Verde

Varietà molto rustica e resistente, ama terreni molto fertili ricchi di sostanza organica e con abbondanti irrigazioni,in condizioni ottimali si possono ottenere produzioni maggiori. TRAPIANTO: a marzo in serra, da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 25 cm sulla fila, 35 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole ma produce bene anche in zone parzialmente ombreggiate. RACCOLTA: da giugno ad ottobre. Le foglie possono essere raccolte già un mese dopo il trapianto.

Spinacio da Taglio

Ibrido molto resistente alle basse temperature che consente buone produzioni in condizioni climatiche anche sfavorevoli. Particolarmente resistente alla salita a seme. TRAPIANTO: da febbraio ad aprile. SESTI D'IMPIANTO: 10 cm sulla fila 15 tra le file. POSIZIONE: in pieno sole, ma produce bene anche in ambienti leggermente ombreggiate. RACCOLTA: da aprile a maggio e generalmente a 30 giorni dal trapianto.

Zucca Delica

Pianta vigorosa e di notevole produttività che si adatta alle diverse condizioni pedo climatiche. Produce frutti del peso di circa 1.7-1.9 kg. Con polpa molto dolce e di elevate qualità organolettiche. TRAPIANTO: da aprile a giugno. SESTI D'IMPIANTO: 1 metro sulla fila, 2.5-3 metri tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da luglio a settembre.

Zucca Marina di Chioggia

Produce zucche dal colore verde che raggiungono dimensioni notevoli. È una varietà eccellente che trova un vastissimo uso in cucina. Si conserva molto bene per il consumo invernale. TRAPIANTO: da aprile a giugno. SESTI D'IMPIANTO: 250 cm tra le file 100 cm sulla fila. POSIZIONE: pianta strisciante che cresce in altezza solo se sostenuta da tutori. RACCOLTA: da agosto ad ottobre.

Zucca Violina

Produce zucche dal colore giallo del peso di circa 3 kg. I frutti possono essere conservati a lungo per il consumo invernale e addirittura nella prima parte della primavera successiva. TRAPIANTO: da aprile a giugno. SESTI D'IMPIANTO: 250 cm tra le file 100 cm sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da agosto ad ottobre.

Zucchino Bianco di Trieste

Varietà molto produttiva e longeva di facile coltivazione, si conferma molto adattabile ai diversi climi anche difficili. TRAPIANTO: in serra da febbraio a marzo, all'aperto tra aprile ed agosto. SESTI D'IMPIANTO: 150 cm tra le file 80 cm sulla fila POSIZIONE: in pieno sole RACCOLTA: da maggio ad ottobre.

Zucchino Bolognese a Clava

Varietà a frutto cilindrico di colore verde scuro brillante, liscio e lungo 18-19cm e dal fiore aperto. Pianta rustica e vigorosa, molto produttiva. TRAPIANTO: in serra da febbraio a marzo. All'aperto tra aprile ed agosto. SESTI D'IMPIANTO: 100 cm tra le file 50 cm sulla fila. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: dopo 35/45 giorni.

Zucchino Giallo

Varietà a maturazione precoce con pianta eretta. Il frutto si presenta cilindrico clavato, a forma di collo d'oca, di colore giallo, a superficie rugosa. Particolarmente apprezzato l'impiego nei prodotti della tradizione culinaria mantovana. TRAPIANTO: da fine marzo - settembre. SESTI D'IMPIANTO: 60 cm sulla fila e 100 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: 35 giorni.

Zucchino Tondo di Piacenza

Ibrido molto produttivo dai frutti rotondi di colore verde brillante. La produzione si prolunga per molto tempo ed è caratterizzato da una buona rusticità e adattabilità ai diversi climi. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra, da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 80 cm sulla fila e 150 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da maggio ad ottobre, circa 20-30 giorni dopo il trapianto.

Zucchino Verde Scuro

Questo ibrido è una dei più produttivi presenti in commercio, tanto che ìiìconsente una raccolta molto prolungata nel tempo di circa 1 o 2 zucchine ogni altro giorno. Sono consigliate irrigazioni frequenti per garantire frutti più serbevoli e poco amari. TRAPIANTO: da febbraio a marzo in serra, da aprile ad agosto in pieno campo. SESTI D'IMPIANTO: 80 cm sulla fila e 150 cm tra le file. POSIZIONE: in pieno sole. RACCOLTA: da maggio ad ottobre, circa 20-30 giorni dopo il trapianto.

Vastissimo assortimento piante fiorite in vaso

Varietà innesti

Anguria Mini Rossa
Anguria Nera
Anguria Tonda
Cetriolo Lungo Olandese
Cetriolo Normale
Melanzana Bianca
Melanzana Lunga Nera
Melanzana Striata
Melanzana Tonda Nera
Melanzana Tonda Viola
Melone Liscio Jolly
Melone Retato
Peperone 3/4 Giallo
Peperone 3/4 Rosso
Peperone Corno Giallo
Peperone Corno Rosso
Peperone Piccante Lungo
Pomodoro Camone
Pomodoro Ciliegino
Pomodoro Costoluto
Pomodoro Cuor di Bue
Pomodoro Datterino
Pomodoro Doppio Innesto Ciliegino Giallo
Pomodoro Doppio Innesto Ciliegino Rosso
Pomodoro Fragolino
Pomodoro San Marzano
Pomodoro Tipo Cancara
Pomodoro Tondo a Grappolo
Pomodoro Tondo Liscio
Melanzane e Pomodori su Patata

Produzione e ingrosso
FioridelleDolomiti
Via Fratte, 1
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461.532094
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it
Orari
Lun.-Sab.08:00-12:00/14:00-18:00
Domenica: Chiuso

Vendita ingrosso
Romagnano Trento
loc. delle Ischie (TN)
Tel. +39 0461.347046
Fax +39 0461.347368
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it
Orari
Lun.-Ven. 08:00-12:00/14:00–18:00
Sabato – Domenica chiuso

Produzione
Via Aeroporto, 34
38100 Gardolo di Trento (TN)
Tel. +39 0461.990666
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it

Trentinoplant GARDEN
Piante da interno,Piante da esterno.
Progettazione, Realizzazione, Manutenzione di aree verdi.
Consegna a domicilio in tutto il Trentino.
Località Campagna Granda 20/A
(vicino stazione Esso ovest)
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461.534405
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@fioridelledolomiti.it
Orari
Lun.-Sab. 08:00-12:00/14:00–19:00
Domenica chiuso

TRENTINOPLANT.COM

Vendita al dettaglio
Trentinoplant SHOP
Piante da interno, piante da esterno, piante da regalo, matrimoni,fiori recisi, allestimenti mostre, addobbi funebri, giardini, manutenzione del verde.
Consegna a domicilio in tutto il Trentino.
Via Tamarisi, 2 c/o Centro Commerciale Shop Center 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461.511119
Fax +39 0461.531747
E-Mail: info@trentinoplant.com
Orari
Lunedi 14:30-20:00
Martedi-Domenica 09:00-20:00

TRENTINOPLANT.COM

Vendita al dettaglio
Trentinoplant TORRE VERDE
Piante da interno, piante da esterno, piante da regalo, matrimoni,fiori recisi, allestimenti mostre, addobbi funebri, giardini, manutenzione del verde.
Consegna a domicilio in tutto il Trentino.
Via Torre Verde ,60
Trento (TN)
Tel./Fax +39 0461.984492
E-Mail: info@trentinoplant.com
Orari
Lunedi 15:30-19:30
Mart.-Sab 08:30-12:30/15:30-19.30
Domenica 09:00-12:30

www.fioridelledolomiti.it